

Листовка: информация за потребителя

Дипрогента 0,5 mg/1 mg/g крем

бетаметазон/гентамицин

Diprogenta 0,5 mg/1 mg/g cream

betamethasone/gentamicin

К.м. Рег. №

20000520

38176 / 07-09-2017

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
- Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

1. Какво представлява Дипрогента и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипрогента
3. Как да използвате Дипрогента
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дипрогента
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Дипрогента и за какво се използва

Дипрогента е крем за прилагане върху кожата. Дипрогента се прилага за облекчаване на възпалението при чувствителни на кортикостероиди кожни заболявания (напр. алергичен дерматит, атопичен дерматит, псориазис, екзема и др.), при които е налице или се подозира инфекция, предизвикана от чувствителни на гентамицин микроорганизми.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Дипрогента

Не използвайте Дипрогента

- ако сте алергични към бетаметазон, гентамицин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6) или към други кортикостероиди или антибиотици от групата на аминогликозидите;
- върху големи участъци от тялото, тъй като това може да увеличи абсорбираното количество;
- по-често или за по-дълго време отколкото Ви е предписал Вашият лекар.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Дипрогента

- ако състоянието на кожата Ви се влоши, кожата изглежда инфектирана или силно изсушена.
- ако имате някакво заболяване или инфекция, уведомете Вашия лекар.

Свържете се с Вашия лекар, ако имате замъглено зрение или други зрителни смущения.

Други лекарства и Дипрогента

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или възможно да приемете други лекарства.



Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма данни за влиянието на продукта върху способността за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Дипрогента

Съдържа хлорокрезол и цетостеарилов алкохол. Може да причини алергични реакции, локални кожни реакции (напр. контактен дерматит).

3. Как да използвате Дипрогента

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар. При необходимост, той може да промени дозата в хода на лечението.

Начин на приложение

Нанесете тънък слой Дипрогента върху засегнатия участък от кожата като втриете леко. Не превързвайте и не поставяйте компреси върху обработената повърхност освен по предписание на Вашия лекар.

Не използвайте стегнати пелени или памперси при дете, лекувано с Дипрогента, освен ако Вашият лекар не Ви е посъветвал. Избягвайте приложението на Дипрогента върху дълбоки кожни рани, отворени рани, изгаряния или наранена кожа.

Честота на приложение

Обикновено два пъти дневно (сутрин и вечер) или както Ви е предписал Вашият лекар. При по-леки случаи заболяването може да се повлияе от приложение веднъж дневно.

Продължителност на лечението

Вашият лекар ще Ви посъветва кога да спрете употребата на Дипрогента.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Дипрогента

Дипрогента трябва да се използва само в препоръчаната дозировка. Свържете се с Вашия лекар, ако сте използвали Дипрогента върху големи участъци от кожата или за по-дълго време от предписаното. Потърсете незабавно медицинска помощ, ако случайно погълнете Дипрогента.

Ако сте пропуснали да използвате Дипрогента

Ако забравите да използвате Дипрогента според предписанието, нанесете лекарството колкото е възможно по-скоро и след това се върнете към редовната схема на приложение.

Ако сте спрели употребата на Дипрогента

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Свържете се с Вашия лекар, ако някоя от следните нежелани лекарствени реакции Ви тревожи: парене, сърбеж, раздразнена/възпалена или суха кожа, възпаление или зачервяване на лицето; увеличено окосмяване; акне; промяна на цвета на кожата; изкървяване на кожата и лесно кървене; стрии, други признаци на възпаление, които не сте наблюдавали до този момент или замъглено зрение.



Ако забележите някакви други, неописани в тази листовка нежелани реакции, свържете се с Вашия лекар.

Деца и подрастващите, на които се налага да ползват Дипрогента, трябва да бъдат внимателно наблюдавани от лекаря си, тъй като лекарството се абсорбира през кожата и може да засегне ръста или да има други нежелани въздействия.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел.: +35928903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дипрогента

Да се съхранява под 25°C.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковката.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дипрогента

- Активните вещества са: бетаметазон 0,5 mg/g (като бетаметазонов дипропионат 0,64 mg/g) и гентамицин 1 mg/g (като гентамицинов сулфат).
- Другите съставки са: хлорокрезол, натриев дихидрогенфосфат дихидрат, фосфорна киселина, течен парафин, цетостеарилов алкохол, макрогол цетостеарилетер, бял мек парафин, натриев хидроксид и пречистена вода.

Как изглежда Дипрогента и какво съдържа опаковката

Крем за прилагане върху кожата, в алуминиеви туби от 15 или 30 g.

Тубата заедно с информационна листовка е поставена в картонена кутия.

Възможно е не всички опаковки да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на Разрешението за употреба

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

бул. "Никола Вапцаров" №55, ЕКСПО 2000, ет.1

Източно крило, Сектори В1 и В2

район Лозенец

гр. София 1407, България

тел. 02/819 3737

факс: 02/862 5196

имейл: info-msdbg@merck.com



Производител
Schering-Plough Labo N.V.,
Industriepark 30,
B-2220 Heist-op-den-Berg,
Белгия

Дата на последно преразглеждане на листовката

