

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА</b>	
Листовка - Приложение 2	
Към Рег. №	20180186
Разрешение №	BG/MK/MB-71992
Одобрение №	124-07-2010

Листовка: Информация за потребителя

**Зил Т**  
**инжекционен разтвор**  
**Zeel T**  
**solution for injection**

Това лекарство се отпуска по лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

**В тази листовка:**

1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
2. Преди да приемете Зил Т
3. Как да приемете Зил Т
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Зил Т
6. Допълнителна информация

**1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва**

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Зил Т се използва:

- Артроза/остеоартрит
- особено при гонартроза
- полиартроза
- спондилартроза
- Синдром на ротаторния маншон
- Ревматични ставни заболявания

**2. Преди да приемете Зил Т**

Не приемайте Зил Т, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт

**Употреба на други лекарства**

Не са известни лекарствени взаимодействия

**Употреба на Зил Т с храни и напитки**

Няма несъвместимости

**Бременност и кърмене**

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство



### **Шофиране и работа с машини**

Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

### **3. Как да приемете Зил Т**

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


При възрастни и деца до 12 год обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Употреба при деца – При деца от 6 до 11 год. възраст  $\frac{2}{3}$  от ампулата 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания –  $\frac{2}{3}$  от ампулата дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Начин на приложение:

Зил Т може да се прилага s.c. (подкожно), i.d. (кожно), i.m. (мускулно) или i.a. (вътреставно).

**Инструкции за отваряне на ампулата:**



Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

**Ако сте приели повече от обичайната доза**  
Зил Т няма доза на предозиране

**Ако сте пропуснали да приемете Зил Т**

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема

**Ако сте спрели употребата на Зил Т**

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, Зил Т може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички ги получават.

**Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата



ул. „Дамян Груев” № 8  
1303 София  
Тел.: +35 928903417  
уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

## 5. Как да съхранявате Зил Т

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!  
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Допълнителна информация

- Какво съдържа Зил Т

1 ампула от 2,0 ml (=2,0 g) съдържа:

Acidum thiocticum	D 8	2,0 mg
Arnica montana	D 4	200,0 mg
Cartilago suis	D 6	2,0 mg
Coenzym A	D 8	2,0 mg
Embryo totalis suis	D 6	2,0 mg
Funiculus umbilicalis suis	D 6	2,0 mg
Nadidum	D 8	2,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum	D 8	2,0 mg
Placenta totalis suis	D 6	2,0 mg
Rhus toxicodendron	D 2	10,0 mg
Sanguinaria canadensis	D 4	3,0 mg
Solanum dulcamara	D 3	10,0 mg
Sulfur	D 6	3,6 mg
Symphytum officinale	D 6	10,0 mg

Помощни вещества

Вода за инжекции, Натриев хлорид

**Как изглежда и какво съдържа опаковката**

Ампули от безцветно стъкло тип I (2,0 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

**Притежател на разрешението за употреба и производител**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 210

E-Mail: [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

**Дата на последно одобрение на листовката**

Март 2018

