

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА

Наименование на лекарствения продукт

Finalgon®
/Финалгон/

Състав

1g маз съдържа:

Nonylic acid vanillylamide	4,0 mg
Nicotinic acid butoxyethylester	25,0 mg



Помощни вещества:

диизопропиладипат, аерозил 200, бял мек парафин, сорбинова киселина, цейлонско цитронелово масло, пречистена вода.

Опаковка

Маз. Алуминиеви туби – 20 г.

Име и адрес на производителя

Schering Wien GmbH
Vienna, Austria

или

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH
Pfaffenrieder Strasse 5
D-82515 Wolfratshausen
Germany

Притежател на разрешението за употреба

Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Germany

Фармакологично действие

- Ванилиламид на нониловата киселина

Ванилиламид на нониловата киселина е синтетичен аналог на капсаицина, с аналгетични свойства.

- Бутоксиетиллов естер на никотиновата киселина

Никотиновата киселина е В – витамин, който притежава съдоразширяващи свойства.

- Комбинацията

Ванилиламид на нониловата киселина и никотиновата киселина, заедно, притежават взаимно-подпомагачи се съдоразширяващи свойства които намаляват времето за хиперемичната кожна реакция при приложение.



Показания

Артрит, ревматични болки в ставите и мускулите, спортни травми, контузии и навяхвания, мускулна болка, причинена от претоварване, лумбаго, неврит, ишиас, бурсит и тендовагинит, за ревулзивна терапия на периферни циркулаторни нарушения.

Противопоказания

Finalgon е противопоказан при пациенти с клинично значима свръхчувствителност към съставките или с прекалено чувствителна кожата. Да не се прилага върху рани, възпалена или разранена кожа.

Предпазни мерки при употреба

Може да се очаква преходно усещане за парене или сърбеж на мястото на приложение. Този ефект се проявява по силно ако е приложено по-голямо количество от лекарствения продукт. След приложение ръцете трябва да се измият обилно с вода и сапун за да се избегне попадане на лекарствения продукт на други места по тялото или върху други хора. Ако Finalgon попадне в очите, носа и устата се получава неприятно, но безвредно усещане за парене. Пациенти с чувствителна кожа не трябва да вземат гореща баня или душ преди или след приложение на Finalgon.

Не се препоръчва приложението на продукта при деца, поради повишен риск от прекомерно чувство за парене.

Лекарствени и други взаимодействия

Няма данни за взаимодействия с други лекарства, приложени локално или системно.

Бременност и кърмене

Не се препоръчва употребата при бременност и кърмене поради липса на данни. Няма данни за преминаването на Finalgon в майчиното мляко.

Влияние върху способността за шофиране

При приложение на лекарствения продукт не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работата с машини.

Дозировка и начин на приложение

Леко се разнася количество, не повече от ½ cm (колкото грахово зърно) за област от тялото, колкото длан **като се използва апликатора.**

Finalgon се прилага 2-3 пъти дневно.

След използване на Finalgon ръцете трябва да се измият обилно със сапун и вода.

Предозиране

При прилагане на по-голямо количество, ефектът се намалява като се третира намазания участък с тампон, напоен с течно масло (например олио) или крем.

Нежелани лекарствени реакции

При отделни пациенти са наблюдавани локални реакции с алергична компонента, като обрив по кожата и оток на лицето след приложение на Finalgon.

Съхранение

Да се съхранява на места, недостъпни за деца.



Срок на годност

Срокът на годност на Finalgon е 3 години от датата на производство. Да не се прилага след изтичане на датата, означена върху опаковката.

Последна редакция:

